



El Surco, S.A. de C.V.
Departamento de Comercialización y
Desarrollo Agrícola



PROGRAMA FISIOTECNOLOGICO PARA CULTIVO DE CHILE.

<i>Epoca de Aplicación</i>	<i>Producto</i>	<i>Dosis por Bomba 4 galones.</i>	<i>Observaciones</i>
10 días antes del transplante	BL 51 - 2 SL	100cc por metro lineal de producto puro.	Biocida, aplicar 10 días antes de la siembra, con regadera, goteo, o por postura aplicando 10 cc de producto puro por medio litro de agua y aplicar sobre el área de siembra
1 día antes de transplante	Busan 34.1 EC Vidate L	4 copas de 25cc 4 copas de 25 cc	Para prevenir ataque de hongos y bacterias del suelo, aplicar 25cc de la mezcla al hoyo de siembra. Para prevenir y controlar ataque de nematodos.
Al momento de transplante	Nutri Full Raizal 400 Confidor	2 copas de 25cc 4 copas de 25cc 2 medidas confidor.	Potencializador de la mezcla, desarrollo radicular y previene ataque de virus causado por mosca blanca. Aplicar 25 cc de la mezcla dirigido al tallo de la planta.
Después de tapar	Thiodan	4 copas	Aplicar sobre la maya para controlar plagas que quedaron adentro del túnel.
8 ddt	Vidate L Poliquel Multi Bela Plus	4 copas 4 Copas. 2 Copas.	Aplicar sobre la maya.
12 ddt	Oberon Nutriplan plus Serenio	20 cc 4 copas 2 Copas.	Aplicar sobre la maya.
16 ddt	rescate Biozyme TF Bela Plus	1 copa 2 copas 2 Copas.	Aplicar sobre la maya.
20 ddt	Vidate L Nutriplan plus Equiation pro	4 copas 4 copas 2 copas	Aplicar sobre la maya.
24 ddt	Viretrol	4 copas	Aplicar sobre la maya.
25 ddt	vertimec Biozime Serenio	20 cc 1.5 copas 2 Copas.	Aplicar sobre la maya.
Después de destapar 30 dds	Vidate L Nutriplan plus Equiation pro	4 copas 4 copas 2 copas	Aplicar sobre el follaje
31 ddt	Viretrol	4 copas	Aplicación al follaje.
32 ddt	vertimec Poliquel calcio Biogib Serenio	20cc 4 copas 3 gramos 2 copas	acaricida Para dar amarre de frutos y aumentar tamaño de los mismos. Fungicida.

<i>Epoca de</i>	<i>Producto</i>	<i>Dosis por Bomba</i>	<i>Observaciones</i>
-----------------	-----------------	------------------------	----------------------

Aplicación		4 galones.	
35 ddt	Monarca Biozyme Bela Plus	1 copa 2 copas 4 Copas.	Insecticida. Para fijar flor y frutos. Bactericida organico.
38 ddt	Vidate I Nutriplan plus Bela Mix	4 copas 4 copas 3 copas	Insecticida. Fungicida.
39 ddt	Viretrol	4 copas	Aplicación al follaje.
41 ddt	oberon Poliquel calcio Bela Plus	20cc 4 copas 4 Copas.	Insecticida. Mejora dureza del fruto. Bactericida organico.
44 ddt	vertimec Biozyme Serenio	20cc 2 copas 2copas	acaricida mejorar pega y flor Fungicida.
47 ddt	monarca Poliquel calcio Biogib Bela Mix	1 copa 4 copas 3 gramos 3 copas	Insecticida. Para dar amarre de frutos y aumentar tamaño de los mismos. Fungicida.
48 ddt	Viretrol	4 copas	Aplicación al follaje.
50 ddt	Rescate Biozyme Bela Plus	1 copa 2 copas 4 Copas.	Insecticida. Para fijar flor y frutos. Bactericida organico.
53 ddt	Monarca K-fol Serenio	1 copa 6 copas 2 copas	Insecticida. Mejora color,sabor y peso. Fungicida.
54 ddt	Baytroid Nutriplan plus Bela Mix	2 copas 6 copas 4 copas	Insecticida. Fungicida.
57 ddt	Oberon K-fol Bela Plus	20 cc 6 copas 4 Copas.	Insecticida. Mejora color,sabor y peso. Bactericida organico.
58 ddt	Viretrol	4 copas	Aplicación al follaje.
60 ddt	vertimec Poliquel Calcio Biogib sereno	20cc 4 copas 3 gramos 2 copas	acaricida Para dar amarre de frutos y aumentar tamaño de los mismos. Fungicida.
63 ddt	Baytroid Biozyme Bela Mix	2 copas 1.5 copas 3 copas	Insecticida. Para fijar flor y frutos. Fungicida.
65 ddt	Rescate K-Fol Bela Plus	1 copa 6 copas 4 Copas.	Insecticida. Mejora color,sabor y peso. Bactericida organico.
68 ddt	Monarca Poliquel Calcio Serenio	1 copa 4 copas 2 copas	Insecticida. Mejora dureza del fruto. Fungicida.
69 ddt	Viretrol	4 copas	Aplicación al follaje.
71 ddt	Baytroid K-fol Bela Mix	2 copas 6 copas 3 Copas.	Insecticida Mejora color,sabor y peso. Fungicida.

**NOTA: REPETIR APLICACIONES CADA CINCO DÍAS DESDE EL DIA 62.
DESPUES DE TRANSPLANTADO.**

